

# INSECTICIDA LARVICIDA

Pyriproxyfen 15%



# Kilarvol® 15 EC

**Insecticida regulador del crecimiento (IGR) en formulación de Concentrado Emulsionable, eficaz en el control de las etapas larvales de insectos voladores, rastreros y arácnidos.**

- ✓ Control efectivo en larvas de moscas.
- ✓ Mayor poder residual.
- ✓ Baja toxicidad para personas y animales.
- ✓ Mayor eficiencia por m².
- ✓ Realiza un control total mezclándolo con insecticidas adulticidas.



Contenido:  
**1 Litro**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO.



v.3



**Clasificación toxicológica IV**  
Poco probable peligro en su  
uso normal.



## INDICACIONES DE USO Y DOSIS

| Tipo de aplicación | Insectos a controlar                                                   | Lugar de aplicación                                                                                          | Dosis recomendada                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspersión          | Moscas y otros voladores.                                              | Pilas de guano, canchas de compostaje, basurales, purineras, establos, caballerizas, grietas, rendijas, etc. | Se recomienda usar 1 ml de KILARVOL 15 EC por m² de superficie. Como recomendación práctica diluir 60 ml de KILARVOL 15 EC en 15 litros de agua en una bomba de espalda y aplicar la mezcla en 60 m² de sustrato. Repetir a los 20 o 30 días. |
|                    | Insectos rastreros (cucarachas, tijeretas, garrapatas, chinches, etc.) |                                                                                                              | Disuelva 100 ml en 5 litros de agua, asperje en 100 m². Asperje en lugares de tránsito o reproducción de los insectos.                                                                                                                        |

**Kilarvol 15 EC** es un regulador del crecimiento de los insectos (IGR) que evita el completo desarrollo de sus formas pre-adultas (Larvas y Ninfas), impidiendo de esta forma que completen su ciclo vital y lleguen al estado adulto. Puede ser usado en interiores y exteriores de empresas de alimentos, casas y oficinas, bodegas y establos, etc.

Tiene efecto sobre distintos tipos de moscas, coleópteros, zancudos, mosquitos, garrapatas, pulgas, tijeretas, baratas, cucarachas, arañas y chinches, entre otros. Es un elemento importante dentro del plan de manejo integrado de plagas (MIP), funciona incluso contra cepas de insectos resistentes a los insecticidas tradicionales como piretroides, organofosforados y otros destinados al control de insectos adultos.

### Técnicas de aplicación

Aplique mediante un atomizador, bomba manual doméstica o bomba de espalda manual, asperje hasta dejar la superficie mojada a punto de goteo (sin que escorra). Calibre adecuadamente el gasto de su equipo pulverizador y respete la dosificación recomendada. Debe ser aplicado en el sustrato en donde se desarrollan los insectos-plaga que se desea controlar, como: basurales, vertederos, suelos, pozos negros, acumulo de excretas o purines, grietas y rendijas, aguas estancadas, purineras, etc.

No mata insectos adultos, por lo que es necesario complementar su uso con un insecticida adulticida.

**Tiempo de reingreso:** 2 horas. Ventile por 15 minutos el recinto tratado, luego reingrese.

### Precauciones para personas y medio ambiente, almacenamiento y conservación

Este producto debe ser aplicado por adultos. No asperje sobre animales domésticos. Para su seguridad debe usar pantalones largos, camisa y guantes para la preparación y aplicación. Es aconsejable el uso de protección respiratoria y antiparras. No asperje sobre alimentos ni utensilios de cocina. Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos. Evite aplicarlo contra el viento. No coma, fume o beba cuando lo aplique. Luego de la aplicación y/o manipulación del mismo debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. Replice triple lavado de los envases antes de desechar. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina. No elimine el contenido de este envase a cursos o fuentes de agua. Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

### Síntomas de intoxicación

Vómitos, diarrea, respiración inusual, pérdida de control muscular.

### Primeros auxilios

**Contacto con la piel:** Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**Contacto con los ojos:** Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

**Ingestión:** No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u

## KILARVOL 15 EC 1 L

hoja de seguridad del producto.  
**Inhalación:** Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

**Antídoto:** No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 2749 8540 (En horario de oficina).

### Condición de Venta: Especializada

**Registro ISP N°: P-619/22**  
Registro Panamá MIDA: RQ-665-15 / Registro Perú SENASA: FF2.73.1.0006 / Registro Costa Rica Min. Salud: P-19-00033

### Composición:

Cada 100 g de producto contiene:  
Pyriproxyfen..... 15 g  
N° CAS: 95737-68-1  
Otros componentes  
C.s.p.....100 g

**Grupo químico:** Mímico de hormona juvenil.

**Acción tóxica:** Supresor de embriogénesis y formación del adulto.



S:  
V:

Fabricado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 735R,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl

93

